

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 17-8-84392506

Publication périodique

Abonnement

annuel : 115,00 F

Régisseur de Recettes

D.D.A. du Nord

C.C.P. 5704 01 W Lille

Edition de la Station Nord - Pas-de-Calais - Picardie  
Tilloy les Mofflaines B.P. 29 - 62217 BEAURAINS Tel. (21) 59.99.35

Siège de la circonscription

Cité administrative 59048 Lille cedex Tel. (20) 52.00.25

Antenne régionale picarde :

(Somme et Oise), 56, rue Jules Barni - 80040 Amiens Tel. (22) 92.51.27

(Aisne) Cité administrative 02016 Laon Tel. (23) 23.00.41

Permanence les lundi, mercredi et vendredi matin

## SPECIAL NORD PAS-DE-CALAIS

BULLETIN TECHNIQUE N° 24 DU 13 AOUT 1984

### BETTERAVES

#### SITUATION :

Les premiers symptômes d'oïdium ont été observés ces derniers jours dans le Cambresis, régions de Béthune et Lillers, ce champignon est parfois associé au Ramularia.

Les brumes matinales suivies d'heures chaudes et ensoleillées sont favorables à l'explosion de la maladie.

Dans certaines parcelles, on constate des dégâts notables de noctuelles défoliatrices (trous importants dans les feuilles).

#### PRECONISATIONS :

- Sur maladies : dès les tous premiers symptômes (étoiles) sur la parcelle ou les voisines, **envisagez un traitement** (voir bulletin n° 19 du 11 juillet 1984).

- . en cas d'oïdium seul avec projet de second traitement, choisir un soufre de bonne qualité (action secondaire sur ramularia),
- . sur parcelle à haut potentiel avec plusieurs maladies, choisir une spécialité polyvalente dès le premier traitement,
- . sur parcelle où un seul traitement est envisagé, préférer une spécialité polyvalente.

- Sur noctuelles : Intervenir en cas d'augmentation des dégâts (avec une pyrethrinoïde ou acephate ou association à base d'endosulfan et parathion ou chlorpyrifos méthyl).

P.1.84

## **POMMES DE TERRE**

### MILDIOU :

Les nombreuses contaminations du 1er au 05 Août ont entraîné, depuis le 08 Août, des sorties de tâches qui coïncident avec de nouvelles contaminations graves (brouillard du 12) ; le risque de mildiou est important. Traitez rapidement et impérativement avant la fin de semaine.

Quelques petits foyers sont signalés. Dans ce cas, intervenir dès réception du bulletin en forçant la dose de la spécialité employée et renouveler en fin de semaine.

Dès que la tubérisation est jugée suffisante, envisagez le défanage chimique pour éviter la contamination des tubercules ; en cas de développement important de la maladie (10 % du feuillage ou plusieurs foyers), il convient de défaner immédiatement.

Soyez particulièrement vigilant vis-à-vis du mildiou en production de pommes de terre féculières qui seront défanées tardivement.

### ENROULEMENTS :

De nombreux cas d'enroulements des feuilles avec teinte violacée sont observés depuis quelques jours. Le rhizoctone est rarement en cause, il peut s'agir d'attaques de virus ou de mycoplasmes. Des tests de laboratoires sont en cours pour vérifier ces hypothèses ; aucun traitement particulier n'est à envisager.

## **ESCOURGEONS - ORGES D'HIVER**

Afin de faire très rapidement le point sur la campagne et envisager la prochaine, nous invitons les personnes qui ont répondu au questionnaire MOSAÏQUE ce printemps à nous adresser les rendements des parcelles.

-o-o-o-o-o-